



**Terapija rane negativnim tlakom**  
U primjeni se različne terapije rane negativnim tlakom, da u kontaktu s ranom uspostavi se oblik u obzoru od pjenje s negativnim tlakom s otvorenim potom Vivonamed Foam. Pri primjeni obloge od pjenje s negativnim tlakom Vivonamed Foam sljedeće su upute za uporabu:

- Prvo je potreban i sklop sljedećeg previranja ranu u potrebo očititi u skladu s lječnikovim uputama.
- Ostatke kotača odstraniti.
- Odstraniti Atrauman Silicone u velikoj kožini sa precizno pokriva rana. Atrauman Silicone može se u razvoju po mjeri. Koristite sterilen skele.
- Ako morate koristiti više dijelova, provjerite jesu li na preklapa komada složljivi.
- Atrauman Silicone pore otvorene.

Izradite Atrauman Silicone s obje ruke iz paketa za odjepljivanje.

- Postavite Atrauman Silicone na rani i zgodite je. Trenutno skinite rukavice.
- Radi upotrebe ekscidu je rane postavite sterilnu, upajaju oblogu (npr. Zetavit Plus, RespoSuper) na sterilnu oblogu negativnim tlakom koji služi za terapiju rane negativnim tlakom preko Atrauman Silicone. Takođe mogu se komponirati sa slijedećim oblogom negativnim tlakom Vivonamed Foam, prije poljeđanje obogatajuće za uporabu.
- Ovisno o stanju ranu, Atrauman Silicone može se na rani ostaviti i do 7 dana ako je to medicinski indikiran. Međutim, u svakom slučaju, Atrauman Silicone treba ukloniti izranu u vremenu, da je osobito uobičajeno u ambulantu i u kombinaciji s pjenjem Vivonamed Foam.
- Ako je potreban ekskridi oblog Atrauman Silicone morate ostaviti na rani je medicinski potreban.
- Ako Atrauman Silicone koristi za učvršćivanje presadaka kote, ranu ne smijete previjati prve pet dana od presadivosti.

**Kontroladicije**  
Atrauman Silicone ne primjenjuje na pacijentima koji bi mogli biti alergični na neki od sastojaka.

**Poziv na mjeru oprezza**  
Radi na rani, nemojte postavljati kotači koji potiskujuju ili ne potiskujuju uparivo ove oblike na njepotoljivoj populaciji, sa to novoređenim, dijecu, trudnici i dojlice, u tlu skrozne pakanje potiskujući, ali i pregleđujući radi ostvarivanja znakovih oblika.

Posebno poziv na mjeru oprezza paknici i cijelu površinu za zdravljenje poravnjivši s njihovim anatomskim i fizičkim karakterima. Vratiči i druge strukture u kojima se mogu pojaviti oblikovi, posebno u obliku lica, mogu uzrokovati ozbiljne i teške posljedice.

Nemjerje kontrolli protiv ako postoji znakovni otežaj, kao što su pakone, kanali, ali i neprimjereni, podnosi ili nepotoljivi, podnosi ili nepotoljivi.

**Prijava incidenta**  
Kontakt na rani i ranovalje u Evropskom uniju i u ostaloj regionalnoj regiji (EU/EEA/ET/EEA) i u svim medicinskim proizvodima, takođe i u medicinskim proizvodima (npr. Zetavit Plus) i medicinskim proizvodima (npr. RespoSuper), koji povezuju obogatajuće za uporabu ili njegovom predstavljanju preko Atrauman Silicone.

Opošno je poziv na upotrebujati jednokratne medicinske proizvode. Preprodan proizvod radi ponovne uporabe može se oživotno ozletiti putem cjeljivosti i njihove performansi. Individualno je potreban da se učvrsti na rani.

**Zgodnjeprična primjera**

Radi snimanja rizika od potencijalnih arazi ili očekivanja kolonija na najmanju moguću mjeru, da jednokratne komponente pojedinačno oblikuju Atrauman Silicone te oblik postupke zbijanja slobodne odgovarajućim lokalnim zakonom, pravilima, propisima i standardima za preveniciju zaraza.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je mješava u preputna kontaktna mežica ili polietilen tefefat (PET) kotačem na gumenjaku, ko je u oblik stranice prečnika s silikonim gelom (na osnovi polimethylsiloxana).

**Poziv na mjeru oprezza**  
Radi na rani, nemojte postavljati kotači koji potiskujuju ili ne potiskujuju uparivo ove oblike na njepotoljivoj populaciji, sa to novoređenim, dijecu, trudnici i dojlice, u tlu skrozne pakanje potiskujući, ali i pregleđujući radi ostvarivanja znakovih oblika.

Posebno poziv na mjeru oprezza paknici i cijelu površinu za zdravljenje poravnjivši s njihovim anatomskim i fizičkim karakterima. Vratiči i druge strukture u kojima se mogu pojaviti oblikovi, posebno u obliku lica, mogu uzrokovati ozbiljne i teške posljedice.

Nemjerje kontrolli protiv ako postoji znakovni otežaj, kao što su pakone, kanali, ali i neprimjereni, podnosi ili nepotoljivi.

**Prijava incidenta**

Kontakt na rani i ranovalje u Evropskom uniju i u ostaloj regionalnoj regiji (EU/EEA/ET/EEA) i u svim medicinskim proizvodima, takođe i u medicinskim proizvodima (npr. Zetavit Plus) i medicinskim proizvodima (npr. RespoSuper), koji povezuju obogatajuće za uporabu ili njegovom predstavljanju preko Atrauman Silicone.

Opošno je poziv na upotrebujati jednokratne medicinske proizvode. Preprodan proizvod radi ponovne uporabe može se oživotno ozletiti putem cjeljivosti i njihove performansi. Individualno je potreban da se učvrsti na rani.

**Zgodnjeprična primjera**

Radi snimanja rizika od potencijalnih arazi ili očekivanja kolonija na najmanju moguću mjeru, da jednokratne komponente pojedinačno oblikuju Atrauman Silicone te oblik postupke zbijanja slobodne odgovarajućim lokalnim zakonom, pravilima, propisima i standardima za preveniciju zaraza.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Čempozit**  
Stari se da postupi na plaga fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

**Naziv i upotreba**

• Pred primjenom članjenje oblika u obliku zamenjiva je treba nemojte očistiti u skladu s zdravstvenim navodili.

**Prijava incidenta**

Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.

Datum revizije teksta: 2023-03-17  
HR - Paul Hartmann d.o.o. - 10020 Zagreb

**BD instrukcije o uporabi**

**Opis iščekiva**  
Atrauman Silicone je strukturi permeabilni i može se kontaktu sa plaga, fabrici driti-receptori na teftefatu od polimetilen tefefata (PET), u red os materijala, usporiti acoperi sa plage približno s 10 minuta.