

# DEZINFEKČNÍ PROGRAM

## pro ambulance



	Přípravek	Koncentrace	Doba působení	Účinnost	Kdy	Jak
<b>Ruce</b>						
hygienická dezinfekce rukou	Sterillium®	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> TM	před a po kontaktu s pacientem; po kontaktu s kontaminovanými místy; před výkony vyžadující aseptické podmínky, po kontaktu s tělními tekutinami	hygienická dezinfekce rukou - vtírat do rukou tak, aby byly po celou dobu aplikace vlhké
	Sterillium® classic pure	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> TM		
	Sterillium® med	konc.	30 s	ABTMV		
mytí	Baktolin® pure				na začátku pracovní směny; při znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem	nanést na mokré ruce, napěnit, opláchnout
péče a regenerace	Baktolan® lotion (pure)				při pocitu vysušených rukou, několikrát za směnu	vetřít do suchých rukou
	Baktolan® balm (pure)					
	Baktolan® protect+ pure					

<b>Kůže</b>						
neporušená kůže	Cutasept® F	konc.	15 s - 1 min	AB <sub>1</sub> T	před vpichem injekce; před zavedením kanyly	nanést rozprašovačem, rozetřít tampónem
rány, sliznice						

<b>Nástroje</b>						
běžné nástroje (nůžky, pinzety, skalpely,...)	Bomix® plus	0,50%	15 min	AB <sub>1</sub>	ihned po použití nástroje	rozevřený nástroj vložit do roztoku, po uplynutí expoziční doby vyjmout, opláchnout a osušit
		2,00%	5 min			
	Korsolex® med AF	0,75%	30 min	AB <sub>1</sub> TM		
		1,5%	15 min			
	Korsolex® plus	1%	60 min	AB <sub>1</sub>		
		2%	30 min			
		3%	15 min			

<b>Plochy</b>						
rychlá dezinfekce	Bacillo® AF	konc.	30 s	AB <sub>1</sub> TM	po kontaminaci plochy	nastříkat na celou plochu, rozetřít
	Bacillo® 30 Foam	konc.	30 s	AB <sub>1</sub>		
	Bacillo® 30 Tissues	utěrka	30 s	AB <sub>1</sub>		
	Mikrobac® Tissues	utěrka	30 s	AB <sub>1</sub>		
	Mikrobac® Virucidal Tissues	utěrka	2 min	AB		otřít utěrkou
dezinfekce s čistícím účinkem	Mikrobac® forte	0,5%	60 min	AB <sub>1</sub>	všechny prostory - denně na vlhko odběrová místa - 3x denně	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít; neosušovat
		1%	30 min			
		2,5%	60 min	AB <sub>1</sub> T		
	Kohrsolin® FF	0,5%	60 min	AB <sub>1</sub>		
		1%	15 min			
		1,5%	60 min	ABTV		

<b>BODE X-Wipes - systém jednorázových utěrek k plošné dezinfekci</b>						
role 90 utěrek	Mikrobac® forte	20 ml / 3 l	60 min	AB <sub>1</sub>	po kontaminaci plochy, povrchu nebo zdravotnického prostředku	pomocí utěrky otřít povrchy a plochy, zdravotnické prostředky; doba použitelnosti roztoku: 28 dní
		40 ml / 3 l	30 min			
	Kohrsolin® FF	40 ml / 3 l	15 min	AB <sub>1</sub>		
	Bacillo® AF	3 l	30 s	AB <sub>1</sub> TM		
role 40 utěrek	Mikrobac® forte	10 ml / 1,5 l	60 min	AB <sub>1</sub>		
		20 ml / 1,5 l	30 min			
	Kohrsolin® FF	20 ml / 1,5 l	15 min	AB <sub>1</sub>		
	Bacillo® AF	1,5 l	30 s	AB <sub>1</sub> TM		

<b>A</b>	baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 16615 nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
	fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 ( <i>Candida albicans</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>B<sub>1</sub></b>	virucidní podle ČSN EN 14476 ( <i>Adenovirus, Poliovirus, MNV</i> )
<b>B</b>	virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN 14476 ( <i>Vacciniavirus</i> ) nebo podle DVV/RKI ( <i>Vacciniavirus, BVDV</i> )
<b>T</b>	tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 ( <i>Mycobacterium terrae</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>M</b>	mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 ( <i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>V</b>	fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 ( <i>Candida albicans, Aspergillus niger</i> ) nebo dle testovacích metod DGHM/VAH
<b>C</b>	sporidicidní podle ČSN EN 14347 nebo na spóry <i>Clostridium difficile</i> ribotyp 027 (Kohrsolin® FF)

