

Schutz- und Hygienemaßnahmen beim Transport von Patienten mit ausgewählten Infektionserregern oder -erkrankungen



Schutzmaßnahmen	Infektionsschutz rot: Overall, Kopfhaut, FFP3-Maske, Schutzbrille, doppelte Handschuhe; Patient: Mund-/Nasenschutz	Infektionserkrankungen gemäß Übersicht	Wischdesinfektion, ggf. Verneblung Vier-Stunden-Wert, RKI-Liste (Viruzid), Desinfektionshalle einsatzbereit nach Einwirkungszeit; Wechsel der Dienstkleidung. Alle Maßnahmen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt.	Bei Durchfall	Hygienemaßnahmen
	Infektionsschutz gelb: Infektionsschutzkittel, Handschuhe, Kopfhaut, Schutzbrille, FFP2-Maske. Bei (**) gemäß Übersicht: FFP3-Maske	Infektionserkrankungen gemäß Übersicht	Wischdesinfektion Ein-Stunden-Wert, IHO Viruzid-Liste (begrenzt viruzid); einsatzbereit nach Einwirkungszeit	Bei C.diff	
	Infektionsschutz MRE: Infektionsschutzkittel, Handschuhe, Mund-/ Nasenschutz	MRE, wenn Patient: <ul style="list-style-type: none"> • ohne Mund-/Nasenschutz oder • mit unbekannter/Multi-Lokalisation oder • direkten, pflegeähnlichen Kontakt erfordert 	Wischdesinfektion Ein-Stunden-Wert, VAH-Liste; ein- satzbereit nach abgetrockneten Flächen	Bei Viren	
	Infektionsschutz grün: Standardschutz, Handschuhe. Keine weitere, spezielle PSA erforderlich	MRSA, wenn Patient: <ul style="list-style-type: none"> • ohne nasale/tracheale Kolonisation oder • mit Mund-/Nasenschutz und/oder • mit abgedeckten Wunden/Hautläsionen Infektionserkrankungen gemäß Übersicht	Wischdesinfektion Ein-Stunden-Wert, VAH-Liste; einsatzbereit nach abgetrockneten Flächen	Bei Viren	

bei möglicher Kontamination / Erregerfreisetzung
 bei mögl. Husten, Erbrechen, Verspritzen von Sekreten, Blut

Infektionserreger oder -erkrankungen ohne Indikation eines Infektionstransportes gemäß Übersicht
 Basishygiene gemäß Hygieneplan. Schwerpunkt: hyg. Händedesinfektion

Übersicht zur Einordnung der Infektionserkrankung mit Leitstellencodes Übergabeprotokoll beachten

Einzelkrankungen	110 ESBL-Infektion	120 <i>Clostridioides difficile</i> -Infektion	140 Cholera
	111 Hepatitis A	121 Diphtherie	142 Polio
	100 Hepatitis B	125 Influenza	
	101 Hepatitis C	126 Masern (**)	
	103 Legionellose	127 bakterielle Meningitis	
	104 geschlossene Tuberkulose	129 Norovirus-Infektion (**)	141 V. a. hämorrhagisches Fieber: Transport i.d.R. durch Kompetenzzentrum (Sonderisoliertransport). Alle Maßnahmen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt.
	113 Pfeiffersches Drüsenfieber	130 Pertussis	
	114 Salmonellen-Infektion	131 Pneumokokken-Infektion	
	115 VRE-Infektion	132 Rotavirus-Infektion	
		133 Scharlach	
Symptome		134 offene Tuberkulose	
		122 Durchfall unklarer Genese (**)	
	112/128 MRSA-Infektion/Kolonisation	123 Hautausschläge unklarer Genese mit Fieber (**)	143 V. a. Infekt. des Respirationstraktes nach Tropenaufenthalt

* ÄLRD = Ärztlicher Leiter Rettungsdienst; LRD = Leiter Rettungsdienst
 ** FFP3-Maske bei HKLE
 *** HKLE = Hochkontagiöse lebensbedrohliche Erkrankung

Quelle:
 Empfehlung des Landesausschusses Rettungsdienst (LARD) in Zusammenarbeit mit dem
 Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) zu Schutz- und Hygienemaßnahmen im
 Rettungsdienst (Stand 04.11.2020)

