




















Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Durchführung
		Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	
	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien (z.B. Blut, Sekreten, Ausscheidungen). <i>Auch wenn Handschuhe getragen wurden!</i>	Sterillium® Sterillium® classic pure Sterillium® med Sterillium® Virugard - einreiben -	gebr.-fertig 30 Sek.	Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben, so dass alle Areale vollständig benetzt werden können. Das Produkt sorgfältig über 30 Sekunden in die Hände einreiben und dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk auf die Fingerkuppen und Daumen legen.
	Bei mutmaßlicher oder wahrscheinlicher Viruskontamination.	Sterillium® Virugard - einreiben -	gebr.-fertig 2 Min.	
	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. <i>Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!</i>	Baktolan® protect Baktolan® protect pure - einreiben -	gebr.-fertig	Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
	Vor Arbeitsbeginn. Nach Toilettenbesuch, nach dem Naseputzen. Bei Verschmutzung.	Baktolin® basic Baktolin® basic pure Baktolin® classic Baktolin® sensitive - waschen -	gebr.-fertig	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	Baktolan® balm Baktolan® balm pure Baktolan® cream Baktolan® lotion Baktolan® lotion pure Baktolan® protect+ pure - einreiben -	gebr.-fertig	Produkt auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
	Bei möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen).	ALLGEMEIN: allergenarme, möglichst ungepuderte Handschuhe verwenden. Persönliche Schutzausrüstung Kategorie I und II puder- und latexfreie Nitrilhandschuhe Peha-soft® nitrile fino, Peha-soft® nitrile white		Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
	Umgang mit verdünnten Desinfektionsmitteln.	Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III puder- und latexfreie Nitrilhandschuhe Peha-soft® nitrile pf, Peha-soft® nitrile guard		
	Wenn mit Keimverschleppung oder Kontamination mit gesundheitsschädigenden Stoffen zu rechnen ist.	Foliodress® S		Der Schutzkittel ist stets geschlossen zu tragen.
	Wenn mit Konzentraten gearbeitet wird, Schutzbrille tragen!	Foliodress® eye protect		Schutzbrille aufsetzen.
	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
		Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.-fertig 30 Sek.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
	Bei jedem Flaschenwechsel.	Warmes Wasser		Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen. Gehäuseteil am Pumpenauslauf besonders beachten.
		Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.-fertig 30 Sek.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigen Materialien. Am Ende des Behandlungstages bzw. nach jeder Behandlung.	SCHNELLEDESINFEKTION: Bacillo® 30 Foam - sprühen / wischen - Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.-fertig 30 Sek.	Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
		ALTERNATIV Bacillo® Tissues - wischen -	gebr.-fertig 30 Sek.	Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
		Dismozon® Plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Hautberührende Flächen nach der Einwirkzeit mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) nachwischen.
		Mikrobac® basic - wischen -	0,5 % 1 Std.	
Mikrobac® forte - wischen -	0,5 % 1 Std.			
	Hilfsmittel nach jeder Benutzung. Werkzeuge bei Bedarf.	SCHNELLEDESINFEKTION: Bacillo® 30 Foam - sprühen / wischen - Bacillo® AF - wischen/sprühen -	gebr.-fertig 30 Sek.	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
		ALTERNATIV Bacillo® Tissues - wischen -	gebr.-fertig 30 Sek.	Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen.
		Dismozon® Plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch wischen, gleichmäßig benetzen. Hautberührende Flächen nach der Einwirkzeit mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) nachwischen.
		Mikrobac® basic - wischen -	0,5 % 1 Std.	
Mikrobac® forte - wischen -	0,5 % 1 Std.			
	Nach Benutzung. Bei Bedarf.	Dismoclean® 61 DWA Dismoclean® 62 KWA	automatisch	Rollator-/Rollstuhl-Waschanlage benutzen. Programm starten.
	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigen Materialien. Räume, Hartfußböden und Inventar arbeitstäglich wischen.	Dismozon® Plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch / Wischmopp wischen. Gleichmäßig benetzen.
		Mikrobac® basic - wischen -	0,5 % 1 Std.	
		Mikrobac® forte - wischen -	0,5 % 1 Std.	
	Bei Bedarf. Tägliche Unterhaltsreinigung.	Reinigungsmittel, z.B. Dismofix® B	Je nach Verschmutzung. 0,25 % - Konz.	Flächen reinigen.
		Dismofix® G	Normale Verschmutzung, manuelle Reinigung 0,5 %	
	Laut Abfallplan. Bei Bedarf.	Abwurf in entsprechende Behältnisse!		Sammeln, desinfizieren, verschließen, entsorgen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden.
	Mitarbeiter, die Kleidung benutzt haben sammeln entsprechend.	Einmalwäsche - verwerfen - Mehrfachwäsche - waschen in Waschmaschine mit handelsüblichen Waschmittel -		Erfassen (sammeln), desinfizieren, säubern (z.B. Kochen der Wäsche).
	Bei Bedarf.	Dismozon® Plus - wischen -	0,4 % 1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.
		Mikrobac® basic - wischen -	0,5 % 1 Std.	
		Mikrobac® forte - wischen -	0,5 % 1 Std.	

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?		Wie? Durchführung
		Präparat / Produkt	Konz. / EWZ	
 Hygienische Händedesinfektion	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination der Hände mit erregerehaltigen Materialien (z.B. Blut, Sekreten, Ausscheidungen). <i>Auch wenn Handschuhe getragen wurden!</i> Bei mutmaßlicher oder wahrscheinlicher Viruskontamination.			Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel in die hohle Hand geben, so dass alle Areale vollständig benetzt werden können. Das Produkt sorgfältig über 30 Sekunden in die Hände einreiben und dabei alle Hautpartien erfassen. Besonderes Augenmerk auf die Fingerkuppen und Daumen legen.
 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. <i>Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!</i>			Produkt entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 Händereinigung	Vor Arbeitsbeginn. Nach Toilettenbesuch, nach dem Naseputzen. Bei Verschmutzung.			Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.			Produkt auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 Schutzhandschuhe	Bei möglichem Kontakt mit erregerehaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Umgang mit verdünnten Desinfektionsmitteln. Umgang mit Desinfektionsmittelkonzentraten (<i>Achtung: Handschuhstulpen umschlagen!</i>).			Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.
 Schutzkittel	Wenn mit Keimverschleppung oder Kontamination mit gesundheitsschädigenden Stoffen zu rechnen ist.			Der Schutzkittel ist stets geschlossen zu tragen.
 Schutzbrille	Wenn mit Konzentraten gearbeitet wird, Schutzbrille tragen!			Schutzbrille aufsetzen.
 Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen	Bei jedem Flaschenwechsel.			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen. Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.
 Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel.			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen. Gehäuseeteil am Pumpenauslauf besonders beachten. Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
 Flächendesinfektion	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigen Materialien.			Flächen mit einem Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
 Einrichtungsgegenstände z. B. Liege, Geräte, Schränke, Arbeitsflächen usw.	Am Ende des Behandlungstages bzw. nach jeder Behandlung.			Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen. Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abwischen. Gleichmäßig benetzen. Hautberührende Flächen nach der Einwirkzeit mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) nachwischen.
 Hilfsmittel-aufbereitung	Hilfsmittel nach jeder Benutzung.			Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen. Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
 Manuelle Aufbereitung z. B. Rollatoren, Rollstühle und ggf. Werkzeuge	Werkzeuge bei Bedarf.			Alternativ gebrauchsfertiges Einmaltuch entnehmen, wischen und anschließend entsorgen. Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch wischen, gleichmäßig benetzen. Hautberührende Flächen nach der Einwirkzeit mit Wasser (mind. Trinkwasserqualität) nachwischen.
 Maschinelle Aufbereitung z. B. Rollatoren, Rollstühle usw.	Nach Benutzung. Bei Bedarf.			Rollator-/Rollstuhl-Waschanlage benutzen. Programm starten.
 Flächendesinfektion Räume, Fußböden und Abfalleimer	Nach tatsächlicher wie vermutlicher Kontamination mit erregerehaltigen Materialien. Räume, Hartfußböden und Inventar arbeitstäglich wischen.			Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch / Wischmopp wischen. Gleichmäßig benetzen.
 Flächenreinigung	Bei Bedarf. Tägliche Unterhaltsreinigung.			Flächen reinigen.
 Abfallentsorgung	Laut Abfallplan. Bei Bedarf.			Sammeln, desinfizieren, verschließen, entsorgen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden.
 Kontaminierte Wäsche	Mitarbeiter, die Kleidung benutzt haben sammeln entsprechend.			Erfassen (sammeln), desinfizieren, säubern (z.B. Kochen der Wäsche).
 Fahrzeuge	Bei Bedarf.			Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.